

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
12 июля 2012 г. № 97

Об установлении клинических показаний, по которым лица подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию, и перечня иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию

На основании абзаца пятого статьи 1, абзацев третьего и четвертого части третьей статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

клинические показания, по которым лица подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию, согласно приложению 1;

перечень иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию, согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
12.07.2012 № 97

Клинические показания, по которым лица подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию

1. На наличие туберкулеза:

1.1. кашель в течение 3 недель и более;

1.2. наличие высокой температуры, продолжающейся более 2 недель;

1.3. кровохарканье;

1.4. дефицит массы тела более 20 % или потеря массы тела более 3 кг за последние 4 недели;

1.5. боли, связанные с дыханием в течение 3 недель и более.

2. На наличие сифилиса:

2.1. мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз, донованоз, эрозивно-язвенные поражения кожи и слизистых любых локализаций;

2.2. психические расстройства (заболевания) при установлении диспансерного наблюдения;

2.3. поражения органов слуха (тугоухость, нарушение функций вестибулярного аппарата) при установлении диспансерного наблюдения;

- 2.4. миокардит, аортит, аневризма аорты, приобретенные пороки сердца, воспалительные изменения паренхиматозных органов неясной этиологии;
- 2.5. остеомиелиты, остеопериоститы, синовиты;
- 2.6. менингоневриты, менингиты, энцефалиты, миелиты, полирадикулоневриты, менинговаскулиты по типу ишемических и геморрагических инсультов, васкулиты спинного мозга, объемные процессы головного и спинного мозга, мононевриты, полиневриты, плекситы, клинические проявления табеса;
- 2.7. носительство вируса иммунодефицита человека;
- 2.8. носительство маркеров парентеральных гепатитов;
- 2.9. обследование лиц с целью выявления инфекций, передающихся половым путем, в том числе лица с установленным диагнозом инфекций, передающихся половым путем, и при анонимном обследовании;
- 2.10. чесотка (кроме детей в возрасте до 14 лет);
- 2.11. глоссит, ларингит, сопровождающиеся дисфонией (хронические формы заболевания);
- 2.12. геморрой, трещины заднего прохода, проктит, парапроктит при установлении диспансерного наблюдения;
- 2.13. высыпания на коже и слизистых оболочках, сопровождающиеся лимфангитом, лимфаденитом (кроме детей в возрасте до 14 лет);
- 2.14. алоpecia;
- 2.15. температурная реакция на прием антибактериальных лекарственных средств;
- 2.16. злокачественные новообразования.
3. На наличие гонореи:
- 3.1. наличие признаков гнойного конъюнктивита;
- 3.2. наличие болей и выделений из прямой кишки, признаки проктита;
- 3.3. воспалительные изменения ротоглотки при подозрении на гонококковую инфекцию;
- 3.4. у мужчин:
- 3.4.1. наличие жалоб на гнойные или слизисто-гнойные выделения из уретры, зуд уретры, дизурия;
- 3.4.2. воспаление в области наружного отверстия уретры, парауретральных ходов;
- 3.4.3. эпидидимит, эпидидимоорхит; простатит, при установлении диспансерного наблюдения;
- 3.5. у женщин:
- 3.5.1. наличие гнойных или слизисто-гнойных выделений из мочеполовых органов, эктопия шейки матки;
- 3.5.2. зуд, жжение при мочеиспускании, боли внизу живота, усиление болей, кровянистые выделения;
- 3.5.3. бесплодие, невынашивание беременности;
- 3.6. вульвовагинит у девочек в возрасте до 18 лет;
- 3.7. гнойный конъюнктивит, вульвовагинит у новорожденных.
4. На наличие сибирской язвы:
- 4.1. поражение кожи в виде папулы (с ее развитием в течение 1–6 дней к везикуле и черному струпу, сопровождающемуся отеком);
- 4.2. тошнота, рвота с анорексией и последующей лихорадкой и абдоминальным дискомфортом при наличии эпидемиологических указаний на возможность сибирской язвы;
- 4.3. острая респираторная инфекция с развитием гипоксии, одышки, высокой температуры и рентгенологическими признаками расширения средостения при наличии эпидемиологических указаний на возможность сибирской язвы;

4.4. высокая лихорадка, в том числе с судорогами, потерей сознания, менингеальными признаками, при наличии эпидемиологических указаний на возможность сибирской язвы.

5. На наличие чумы:

5.1. болезненное воспаление лимфатических узлов с лихорадкой, ознобом, головной болью, слабостью, протрацией и острым началом при наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы;

5.2. кашель с мокротой, содержащей кровь, болью в грудной клетке, затрудненным дыханием и лихорадкой при наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы;

5.3. сочетание признаков, указанных в подпунктах 5.1 и (или) 5.2 настоящего пункта, при наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы.

6. На наличие холеры:

6.1. острая водянистая диарея с тяжелой дегидратацией у пациента в возрасте от пяти лет и старше;

6.2. острая водянистая диарея с рвотой или без рвоты у пациента в возрасте от пяти лет и старше в регионе, где имеется холера;

6.3. наличие признаков, указанных в подпунктах 6.1 и (или) 6.2 настоящего пункта, у лица (включая детей в возрасте до пяти лет), прибывшего из мест, эндемичных по холере, либо имевшего контакт с лицами, заболевшими холерой.

7. На наличие геморрагических лихорадок Эбола и Марбург:

7.1. диарея (кровянистая) и рвота с острой лихорадкой, инъекцией конъюнктив, дисфагией, носовыми и десневыми кровотечениями, пурпурой и макулопапулярной сыпью;

7.2. наличие указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта признаков при эпидемиологических указаниях на возможность геморрагических лихорадок Эбола и Марбург;

7.3. физический контакт лица с биологическими жидкостями другого лица, заболевшего геморрагической лихорадкой Эбола или Марбург, в течение 21 дня со дня контакта.

8. На наличие геморрагической лихорадки Ласса: наличие одного или нескольких симптомов: слабость, лихорадка, головная боль, боли в горле, кашель, тошнота, рвота, диарея, миалгия, боль в груди, потеря слуха и контакт с биологическими жидкостями лица, заболевшего подтвержденной лихорадкой Ласса, контакт с выделениями грызунов в эпидемичном по лихорадке Ласса районе.

9. На наличие вируса иммунодефицита человека:

9.1. клинические симптомы:

необъяснимая суб- или фебрильная лихорадка, длящаяся более 3 месяцев;

лимфаденопатия свыше 3 месяцев;

необъяснимая диарея, длящаяся более 1 месяца;

необъяснимая потеря массы тела (10 и более процентов);

рецидивные пневмонии (2 и более раза в год);

рецидивирующий сепсис;

подострый энцефалит и слабоумие у ранее здоровых лиц (энцефалопатии);

серозный менингит, менингоэнцефалит неустановленной этиологии;

рецидивирующий кандидоз;

9.2. подозрение или подтвержденный диагноз:

множественные или рецидивные бактериальные инфекции у ребенка в возрасте до 13 лет;

кандидоз бронхов, трахеи, легких, пищевода;

кокцидиомикоз распространенный или внелегочный;

криптококкоз внелегочный;

гистоплазмоз распространенный или внелегочный;
 криптоспоридиоз кишечный с диареей, длящийся более 1 месяца;
 токсоплазмоз мозга у лица в возрасте старше 1 месяца;
 изоспороз кишечный хронический (с диареей более 1 месяца); цитомегаловирусная инфекция (исключая поражения печени, селезенки, лимфатических узлов) у пациентов в возрасте старше 1 месяца;
 цитомегаловирусный ретинит с потерей зрения;
 инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса: хронические язвы, сохраняющиеся более 1 месяца, бронхит, пневмония, эзофагит;
 легочный и внелегочный туберкулез;
 микобактериоз диссеминированный или внелегочный;
 сальмонеллезная рецидивная септицемия;
 пневмоцистная пневмония;
 саркома Капоши;
 инвазивный рак шейки матки;
 лимфоидная интерстициальная пневмония у детей в возрасте младше 13 лет;
 лимфома иммунобластная; первичная лимфома мозга;
 задержка внутриутробного развития и (или) аномалии развития новорожденных детей, дети при срочных доношенных родах с массой тела менее 2500 граммов.

Приложение 2
 к постановлению
 Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 12.07.2012 № 97

**ПЕРЕЧЕНЬ
 иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому
 освидетельствованию**

1. На наличие туберкулеза:
 - 1.1. лица с наличием установленного контакта с другим лицом, больным туберкулезом;
 - 1.2. ВИЧ-инфицированные лица;
 - 1.3. лица без определенного места жительства;
 - 1.4. беженцы, мигранты;
 - 1.5. лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, в течение первых двух лет;
 - 1.6. лица, находящиеся в стационарных учреждениях социального обслуживания;
 - 1.7. лица, страдающие хроническим алкоголизмом и наркоманией.
2. На наличие сифилиса:
 - 2.1. лица с наличием установленного контакта (половой или тесный бытовой) с другим пациентом, больным сифилисом;
 - 2.2. беременные женщины;
 - 2.3. женщины, при наличии у них в анамнезе невынашивания беременности, преждевременных родов, мертворождения;
 - 2.4. лица, подвергшиеся сексуальному насилию;
 - 2.5. мужчины, имевшие секс с другими мужчинами, лица, занимающиеся проституцией;
 - 2.6. медицинские работники – в случае контакта с заразным биологическим материалом пациента (в результате пореза, укола и других ситуаций);
 - 2.7. несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних;

- 2.8. женщины, направляемые на прерывание беременности или внутриматочные манипуляции;
- 2.9. пациенты, за которыми установлено диспансерное наблюдение в наркологических диспансерах;
- 2.10. лица в возрасте старше 13 лет при госпитализации.
3. На наличие гонореи:
 - 3.1. лица:
 - 3.1.1. вступавшие в половой контакт с другими лицами, больными гонореей;
 - 3.1.2. проходящие специальное скрининговое обследование на другие инфекции, передающиеся половым путем, или с установленным диагнозом инфекции, передающейся половым путем;
 - 3.1.3. подвергшиеся сексуальному насилию;
 - 3.1.4. проходящие контроль излеченности по гонококковой инфекции;
 - 3.2. женщины:
 - 3.2.1. направляемые на прерывание беременности, инвазивные гинекологические манипуляции;
 - 3.2.2. беременные женщины;
 - 3.2.3. роженицы без обменных карт в родильных домах;
 - 3.2.4. родильницы с осложненным течением послеродового периода на 5-й, 6-й день после родов.
4. На наличие чумы, холеры, сибирской язвы, геморрагических лихорадок Ласса, Марбург, Эбола:
 - 4.1. лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных стран (территорий) по указанным заболеваниям;
 - 4.2. лица, контактировавшие с источником указанных заболеваний;
 - 4.3. лица, находившиеся (находящиеся) в очаге указанных заболеваний.
5. На наличие вируса иммунодефицита человека:
 - 5.1. беременные женщины при постановке на учет и в третьем триместре беременности, при поступлении на роды при отсутствии результата обследования на вирус иммунодефицита человека;
 - 5.2. дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей;
 - 5.3. лица с инфекциями, передающимися половым путем, – при постановке диагноза;
 - 5.4. лица с установленным диагнозом парентерального вирусного гепатита при постановке диагноза и через 6 месяцев;
 - 5.5. лица, употребляющие наркотические средства, – при выявлении и далее ежегодно (при отрицательном результате);
 - 5.6. лица, находящиеся в местах содержания под стражей, – при поступлении;
 - 5.7. лица при наличии эпидемиологических показаний;
 - 5.8. иностранные граждане и лица без гражданства при обращении в установленном законодательством Республики Беларусь порядке за получением гражданства Республики Беларусь, вида на жительство в Республике Беларусь, статуса беженца.